

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**25.07.2017 № 846**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA/4415/02/01**

**ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**18.08.2021 №1752**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**

**ЭНТЕРОСГЕЛЬ**  
**(ENTEROSGELUM)**

***Состав:***

*действующее вещество:* 100 г пасты содержит гидрогель метилкремниевой кислоты 70 г  
*вспомогательные вещества:* вода очищенная.

**Лекарственная форма.** Паста для перорального применения.

*Основные физико-химические свойства:* однородная пастоподобная масса белого цвета, без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В С.

***Фармакологические свойства.***

*Фармакодинамика.*

Энтеросгель – инертное кремний-органическое соединение. При применении обладает сорбционным действием. Препарат эффективно адсорбирует среднемoleкулярные токсические вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма.

Энтеросгель устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.

*Фармакокинетика.*

Обволакивая слизистую оболочку желудка и кишечника, Энтеросгель защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.

Энтеросгель не всасывается из кишечника и не претерпевает метаболических или химических превращений.

**Клинические характеристики.**

***Показания.***

В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности; при токсическом гепатите, вирусном гепатитах А, В, циррозе печени и холестазах различного генеза; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью; при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; гнойно-септических и воспалительных процессах, которые

сопровожаются интоксикацией; токсикозах беременных первой половины беременности, в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

***Противопоказания.***

Острая кишечная непроходимость.

***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

Препарат может уменьшать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним. Не рекомендуется одновременный прием с препаратами, относящимися к классу секвестрантов желчных кислот, например холестираминол, вследствие усиления вероятности развития запоров.

Препарат не следует применять совместно с препаратами серебра.

***Особенности применения.***

При условии соблюдения способа применения (Энтеросгель и лекарственные средства принимают с интервалом 1,5-2 часа), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с пребиотиками и пробиотиками (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами.

***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Препарат можно применять при беременности и в период кормления грудью. Следует ограничить применение у беременных, склонных к развитию запоров.

***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.***

Не влияет.

***Способ применения и дозы.***

Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после пищи или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей старше 14 лет разовая доза препарата составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза – 45 г.

Для детей с рождения до 5 лет: разовая доза препарата составляет 5 г (чайная ложка), суточная доза – 15 г; от 5 до 14 лет: разовая доза – 10 г (десертная ложка), суточная доза – 30 г.

Курс лечения – от 7 до 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний на протяжении первых трех суток возможно применение двойной разовой дозы, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более продолжительное (до 1 месяца) применение препарата.

***Дети.***

Препарат применяют детям с рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением разовую дозу препарата смешивают с небольшим количеством воды.

***Передозировка.***

Случаев передозировки препарата не описано. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

***Побочные реакции.***

При приеме препарата возможны диспепсические явления. В первые дни приема

препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения людям, склонным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия).

**Срок годности.** 3 года.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °С, не допускать замораживания. После замораживания теряет свои свойства. После вскрытия упаковки хранить при тех же самых условиях в плотно закрытой таре.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 135 г или 270 г, или 405 г в контейнере; по 1 контейнеру в коробке из картона; по 15 г в пакете; по 15 или 30 пакетов в коробке из картона; по 90 г или 225 г в тубе; по 1 тубе в коробке из картона.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.**

ПрАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

**Местонахождение производителя и место осуществления его деятельности.**

Украина, г. Киев, ул. Радищева, 3.

**Дата последнего пересмотра.** 18.08.2021 г.